

Preparazione per Paziente Ambulatoriale:

MODALITÀ DI PREPARAZIONE PER ESAMI RADIOLOGICI CON MEZZO DI CONTRASTO ORGANO IODATO ENDOVENA

(estratto dalla Carta dei Servizi Rev.6 del 16.11.2019)

Il giorno dell'esame:

- esibire il risultato dell'esame di laboratorio per la **CREATININEMIA** eseguito non prima dei 30 giorni che precedono l'esecuzione dell'esame;
- presentarsi a **digiuno da almeno 6 ore** (si può bere solo acqua e non bisogna assolutamente sospendere l'eventuale terapia farmacologica in corso);

PAZIENTI 'ALLERGICI' PER I QUALI È INDICATA LA PREMEDICAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE ESAME TC CON MDC (Estratto dalle Linee Guida SIRM – ESUR 9.0)

- Pazienti con pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un'indagine con MDC iodato.
- Pazienti affetti da asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica.
- Pazienti affetti da mastocitosi (gruppo eterogeneo di emopatie maligne rare, acquisite e croniche, dovute a una proliferazione anomala dei mastociti nei tessuti)
- Pazienti con pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di shock anafilattico in cui NON è riconoscibile la causa scatenante).

In questi casi si propone il seguente schema di profilassi in accordo con il medico curante:

Prednisone (Deltacortene) 50 mg cpr o Metilprednisolone (Medrol) 32 mg 13, 7, e 1 ora prima dell'esame + cetirizina (Zirtec) 10 mg cpr o 20 gocce 1 ora prima dell'esame.

PER I PAZIENTI CON ORTICARIA IN ATTO O ASMA BRONCHIALE SINTOMATICO se possibile rimandare l'esame fino alla stabilizzazione clinica.

PAZIENTI 'ALLERGICI' PER I QUALI NON È INDICATA LA PREMEDICAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE ESAME TC CON MDC

- Pazienti con pregressa anafilassi (ovvero storia di episodio/i di shock anafilattico in cui È RICONOSCIBILE la causa scatenante):
- Pazienti allergici al mezzo di contrasto di altra classe (mdc per RM, mdc per ecografia)
- Pazienti con qualsiasi tipo di allergia alimentare
- Pazienti allergici a tutte le altre categorie di farmaci
- Pazienti allergici agli antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone e iodoformio
- Pazienti con allergie stagionali ai pollini
- Pazienti allergici a punture di insetti
- Pazienti allergici a qualsiasi altra sostanza nota

N.B.:

- si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l'impegnativa del medico curante o specialista;
- si raccomanda di portare in visione tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso;
- la non osservanza delle indicazioni sopra elencate pregiudica l'esecuzione dell'esame

Si ricorda di presentarsi in ambulatorio con l'impegnativa del medico curante o specialista dopo aver provveduto all'accettazione presso gli sportelli siti al 1° piano se l'esame è programmato tra le ore 7.30- 13.00, al piano terra se programmato tra le ore 13.00 e le 18.00