



UNITÀ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PREPARAZIONE PER RETTOSIGMOIDOSCOPIA

DIETA: Il giorno precedente l'esame evitare i seguenti alimenti:

- verdure
- legumi (piselli, lenticchie, etc...),
- ortaggi e frutti con bucce o semi (uva, pomodori, fichi, etc...).

MATERIALE: n. 2 clisteri tipo "STIPSIGOL CLISMA" da 120 ml

PREPARAZIONE: Praticare 1 clistere la sera che precede l'esame e 1 clistere circa due ore prima dell'esame endoscopico, stando a letto e trattenendo la soluzione per almeno 10 (dieci) minuti prima di evacuare. La mattina dell'esame digiuno.

Raccomandazioni per pazienti ambulatoriali

- **SE LA PRESTAZIONE VIENE ESEGUITA A PAGAMENTO NON SERVONO LE IMPEGNATIVE**
- **SE LA PRESTAZIONE VIENE ESEGUITA COL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN) OCCORRE PORTARE LE SEGUENTI N.2 (DUE) IMPEGNATIVE del proprio Medico curante:**

I SEGUENTI CODICI SONO INDICATIVI PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI

1

- (COD. 45.24) RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
- (COD. 45.24.1) RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA
- (COD. 45.24.2) RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA
- (COD. 99.29.A) SEDAZIONE COSCIENTE

2

ESAME ISTOLOGICO

- (COD. 91.41.8) ES. ISTOCITOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA SEMPLICE (QUANTITÀ 7)
- (COD. 91.41.F) ES. ISTOCITOPALOGICO APPARATO DIGERENTE. ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE (QUANTITÀ 1)

LE IMPEGNATIVE DEVONO ESSERE PRESENTATE AGLI SPORTELLI DOPO L'ESECUZIONE DELL'ESAME ENDOSCOPICO

- L'impegnativa per l'esame istologico non sarà ovviamente utilizzata se durante l'esame endoscopico non saranno eseguite biopsie
- Portare la documentazione sanitaria: precedenti indagini endoscopiche, radiografie, esami di laboratorio etc...
- È indispensabile essere accompagnati da una persona di fiducia in grado di guidare l'auto in quanto, a causa della sedazione pre-endoscopica, il paziente non potrà condurre l'auto dopo l'esame. In caso di mancato accompagnamento l'esame non potrà essere eseguito.
- È indispensabile **EVITARE** di portare con sé oggetti di valore presso gli ambulatori di Endoscopia.



NOTA BENE
(SOLO PER PAZIENTI CHE ESEGUONO TERAPIE CON FARMACI
ANTICOAGULANTI)

- 5 giorni prima dell'esame endoscopico, si consiglia la sospensione dell'antiaggregante piastrinico (Clopidogrel; Prasugrel; Ticagrelor) o dell'anticoagulante (Coumadin o altra tipologia) e l'eventuale sostituzione con eparina a basso peso molecolare **previa consultazione e benessere dello specialista che li ha prescritti (cardiologo, ematologo, chirurgo vascolare o altri).**
- L'eparina può essere eseguita fino alla sera precedente l'esecuzione dell'esame endoscopico.
- Non eseguire l'eparina la mattina dell'esame endoscopico.
- Il giorno prima dell'esame endoscopico è necessario eseguire i seguenti esami ematochimici:
 - ✓ Emocromo
 - ✓ Assetto emocoagulativo (PT, PTT, INR)Portare i referti in visione.
- L'antiaggregante o l'anticoagulante potranno essere assunti dopol'esecuzione dell'esame endoscopico.

La mancata osservanza delle suddette indicazioni potrebbe non consentire l'esecuzione di biopsie e/o di manovre operative come, per esempio, la polipectomia.