

**UNITÀ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

**PREPARAZIONE PER ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA**

**ESAME PRIMA DELLE ORE 14.00**

La sera precedente l'esame consumare un pasto leggero senza formaggi e verdure. Digiuno dalla mezzanotte (liquidi compresi).

**ESAME DOPO LE ORE 14.00**

La sera precedente l'esame consumare un pasto leggero senza formaggi e verdure.

La mattina dell'esame, entro le ore 8.00, consumare una colazione leggera: tè con 2 biscotti o 2 fette biscottate (senza latte).

Il giorno dell'esame non fumare, non usare rossetto né maquillage. È utile indossare indumenti larghi e comodi.

**Raccomandazioni per pazienti ambulatoriali**

➤ **SE LA PRESTAZIONE VIENE ESEGUITA A PAGAMENTO NON SERVONO LE IMPEGNATIVE**

- **SE LA PRESTAZIONE VIENE ESEGUITA COL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN) OCCORRE PORTARE LE SEGUENTI N.2 (DUE) IMPEGNATIVE del proprio Medico curante:**

**I SEGUENTI CODICI SONO INDICATIVI PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI**

- ① **COD. 45.13 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA**  
**COD. 44.14 BIOPSIA DELLO STOMACO**  
**COD. 99.29.A SEDAZIONE COSCIENTE**

- ② **ESAME ISTOLOGICO**  
**(COD.91.41.8) ES. ISTOCITOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE.**  
**BIOPSIA SEMPLICE (Quantità7)**  
**(COD.91.41.C) ES. ISTOCITOPALOGICO APPARATO DIGERENTE.**  
**BIOPSIA ENDOSCOPICA PER CELIACHIA (Quantità 1)**  
**Sarà erogata soltanto una delle prestazioni prescritte in base alle risultanze dell'esame endoscopico.**

**LE IMPEGNATIVE DEVONO ESSERE PRESENTATE AGLI SPORTELLI SOLO DOPO L'ESECUZIONE DELL'ESAME ENDOSCOPICO**

- L'impegnativa per l'esame istologico non sarà ovviamente utilizzata se durante l'esame endoscopico non saranno eseguite biopsie
- Portare la documentazione sanitaria: precedenti indagini endoscopiche, radiografie, Esami di laboratorio etc...
- È indispensabile essere accompagnati da una persona di fiducia in grado di guidare l'auto in quanto, a causa della sedazione pre-endoscopica, il paziente non potrà condurre l'auto dopo l'esame. **In caso di mancato accompagnamento l'esame non potrà essere eseguito.**
- È indispensabile **EVITARE** di portare con sé oggetti di valore presso gli ambulatori di Endoscopia.

**NOTA BENE**  
**(SOLO PER PAZIENTI CHE ESEGUONO TERAPIE CON FARMACI ANTICOAGULANTI)**

- 5 giorni prima dell'esame endoscopico, si consiglia la sospensione dell'antiaggregante piastrinico (Clopidogrel; Prasugrel; Ticagrelor) o dell'anticoagulante (Coumadin o altra tipologia) e l'eventuale sostituzione con eparina a basso peso molecolare **previa consultazione e benessere dello specialista che li ha prescritti (cardiologo, ematologo, chirurgo vascolare o altri).**
- L'eparina può essere eseguita fino alla sera precedente l'esecuzione dell'esame endoscopico.
- Non eseguire l'eparina la mattina dell'esame endoscopico.
- Il giorno prima dell'esame esclusivamente per i pazienti che assumono terapia anticoagulante (Coumadin) è necessario eseguire i seguenti esami ematochimici:
  - ✓ Emocromo
  - ✓ Assetto emocoagulativo (PT, PTT, INR)Portare i referti in visione.
- L'antiaggregante o l'anticoagulante potranno essere assunti dopo l'esecuzione dell'esame endoscopico.

**La mancata osservanza delle suddette indicazioni potrebbe non consentire l'esecuzione di biopsie e/o di manovre operative come, per esempio, la polipectomia.**